

عنوان مقاله:

برخی از عوامل موثر بر LBW و مرگ نوزادان

محل انتشار:

سومین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی (سال: 1399)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

تکتم فرقانی - مرکز بهداشت فریمان ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

فاطمه رضایی شریف - گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، ایران

فرزانه صحافی - پزشک عمومی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

نسرين شوقی - بیمارستان حضرت زهرا(س) ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

مریم خانزاده جامی - بیمارستان حضرت زهرا(س) ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

خلاصه مقاله:

وزن کم تولد از عوامل خطر مرگ و میر و ابتلاء نوزادان به بیماریهای مختلف در دوره نوزادی و مراحل بعدی زندگی آنها می باشد. دربررسی تحلیلی-مقطعی، کلیه نوزادان به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند، اطلاعات موردنیاز از سامانه سینا استخراج و با استفاده از نرم افزارSPSS و آزمونهای Pearson's Chi Square و Fishers Exact تجزیه و تحلیل شدند. LBW و مرگ نوزادان به ترتیب % 6/46 و 7/73 در هزار بود. وزن تولد با جنس، نوع زایمان و سن بارداری هنگام زایمان و فوت آنان ارتباط معناداری داشت ($P<0/05$). بیش از 42% از نوزادان فوت شده در کمتر از 24 ساعت پس از تولد فوت کردند. مهمترین علل فوت به ترتیب نارس و آسپیراسیون بود. بیش از 64 درصد مرگهای نوزادی در نوزادان نارس و LBW رخ داده بود که این موضوع اهمیت مراقبتهای آموزشی و آموزشی بارداری را نشان می دهد.

کلمات کلیدی:

نوزاد کم وزن ، مرگ، نوزاد

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1167633>

