

عنوان مقاله:

تعبین روند اختلالات اپیدمیولوژیکی عملکرد جنسی و فاکتورهای تاثیر گذار بر آن در دختران جوان شهر قزوین

محل انتشار:

سومین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی (سال: 1399)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسندگان:

اصغر کاربرد - کارشناس ارشد اپیدمیولوژی و عضو هیات علمی گروه تکنولوژیست جراحی، دانشکده پیراپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی قزوین

فریبا هاشمی - کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی و جراحی و عضو هیات علمی گروه تکنولوژیست جراحی، دانشکده پیراپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی قزوین

علیرضا شفیعی - کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی و جراحی و عضو هیات علمی گروه تکنولوژیست جراحی، دانشکده پیراپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مهران محبی علیداش - دانشجوی رشته کارشناسی پرستاری - دانشکده پیراپزشکی- دانشگاه آزاد واحد قزوین

زهرا جوادی نوده - دانشجوی رشته کارشناسی پرستاری - دانشکده پیراپزشکی- دانشگاه آزاد واحد قزوین

محمدامین شهرباف - دانشجوی رشته کارشناسی پرستاری - دانشکده پیراپزشکی- دانشگاه آزاد واحد قزوین

خلاصه مقاله:

یکی از گزینه های مهم و جدایی ناپذیر انسان، میل جنسی است و قسمت مهمی از زندگی آن می باشد. این غریزه و مشکلات ناشی از آن بسیار بر اهمیت است. بر اساس مطالعات انجام شده نگرانی های جنسی در هر کشور دارای پراکندگی خاصی است اما نقطه مشترک اکثریت مطالعات، افزایش اختلالات جنسی دختران جوان در دوره نوجوانی می باشد. امروزه تحقیقات انجام شده بیانگر آن است که اختلالات جنسی در تمامی دوران زندگی یک زن می تواند مشکلات جنسی وجود داشته باشد و این مسئله سبب گشت که در این مطالعه به نگرانی های جنسی در سنین جوانی نیز، توجه نماییم. هدف: این مطالعه به منظور روند اختلالات اپیدمیولوژیکی عملکرد جنسی و فاکتورهای تاثیر گذار بر آن در دختران جوان شهر قزوین در سال 1398 انجام شد. مواد و روش ها: مطالعه از نوع مقطعی و جامعه پژوهش کلیه دختران جوان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قزوین می باشد. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای دو مرحله ای است. در مناطق 1 و 2 و 3 در شهر قزوین، ابتدا هر مرکز بهداشتی درمانی را به عنوان یک خوشه در نظر گرفته و از مناطق به صورت تصادفی چند مرکز را انتخاب کرده سپس از میان مراکز انتخابی به صورت تصادفی ساده 1240 نفر را انتخاب می کنیم. روش جمع آوری اطلاعات به صورت پرسشنامه (اپیدمیولوژیک، بهداشت جنسی پرسشنامه هایی نظیر ویژگی دموگرافیک، آگاهی جنسی، سواد جنسی و اختلالات جنسی بر اساس DSM-IV بود. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمون های آماری مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: 8 / 44 درصد واحد های پژوهش معتقدند انجام فعالیت جنسی زیاد مضر است؛ لکن متاهلین یکبار در هفته، فعالیت جنسی داشته اند، 6 / 51 درصد آنان، یک الی دوبار در هفته فعالیت جنسی داشته اند. 9 / 43 درصد دختران جوان از نظر عملکرد جنسی نرمال و 4 / 31 درصد اختلال خفیف و شیوع اختلال شدید 8 / 18 درصد بود. شدت اختلال با سن زیر 18 سال ارتباط معنی دار داشت ($p=0/001$)؛ به گونه ای که اختلال شدید در بین سنین 12 تا 16 سال بسیار شایع تر بود. بطور کلی نمره بهداشت جنسی در این سنین با افزایش سن و تحصیلات کاهش، بگونه ای که زیر 18 سال بیشترین اختلال عملکرد جنسی مشاهده می شود. لذا بررسی های بیشتر جهت یافتن الگوی دقیق تغییرات جنسی در این دوران و نیز شناخت اپیدمیولوژی آن توصیه می شود. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه می توان گفت که اصلی ترین علل اختلال عملکرد جنسی در دختران جوان درد، خشکی مهبل و نداشتن ارگاسم و در دختران جوان متاهل عدم ارگاسم می باشد.

کلمات کلیدی:

عملکرد جنسی، اختلالات اپیدمیولوژیکی، دختران جوان

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1167664>

