

عنوان مقاله:

مروری بر تأثیر جراحی اندومتریوما با سایزبزرگتر بر میزان بارداری زنان نازا

محل انتشار:

سومین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی (سال: 1399)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسنده:

الناز عابدینی

خلاصه مقاله:

مقدمه: باتوجه به اینکه اندومتریوز از شایعترین بیماریهای مزمن زنان است که میتواند باعث بروز نازایی گردد. برداشتن اندومتریوما از طریق جراحی میتواند باعث کاهش درد و بهبود کیفیت زندگی بیماران گردد، در حالی که تأثیر آن بر روی باروری با پیشرفت روزافزون علم هنوز بحث برانگیز است، مطالعه حاضر با هدف مروری بر تأثیر جراحی اندومتریوما بر پیامد و میزان باروری در زنان مبتلا انجام میشود. روشکار: این مطالعه مروری کارآزمایی بالینی در سال 1398 بر روی 110 زن مبتلا به اندومتریومای بزرگتر از 3 سانتیمتر که از نازایی شکایت داشتند، انجام شد. پس از تخصیص تصادفی، گروه مداخله جراحی اندومتریوما شدند و گروه کنترل نیز درمان انتظاری را دریافت نمودند و به مدت 4,5 ماه از نظر باروری تحت پیگیری قرار گرفتند. گردآوری داده ها با استفاده از چک لیست پژوهشگر ساخته انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرمافزار آماری SPSS نسخه 20 و آزمونهای تی مستقل و کای دو انجام شد یافته ها: فراوانی وقوع حاملگی در گروه مداخله (70/4%) با گروه کنترل (29/6%) اختلاف آماری معنیداری داشت $p=0/023$ همچنین فراوانی حاملگی خودبهخود نیز در دو گروه مداخله و کنترل تفاوت آماری معناداری مشاهده گردید که 40 نفر (98/7%) در برابر 15 نفر (47/3%) $p=0/001$ نتیجه گیری: جراحی اندومتریومای بزرگتر و مساوی 3 سانتیمتر در زنان نابارور مؤثر میباشد و امکان بارداری خودبه خودی بدون انجام سایر درمانهای نازایی را افزایش میدهد.

کلمات کلیدی:

بارداری خود به خودی- نازایی - اندومتریوما

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1167681>

