سیویلیکا – ناشر تخصصی مقالات کنفرانس ها و ژورنال ها گواهی ثبت مقاله در سیویلیکا CIVILICA.com

عنوان مقاله:

بررسی شیوع افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپ در رفسنجان در سال ۱۳۹۳

محل انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران, دوره 27, شماره 153 (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نويسندگان:

Assistant Professor, Department of Neurology, Non-Communicable Diseases Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, - امير مقدم احمدى Rafsanjan, Iran

Associate Professor, Department of Psychiatry, Addiction and Behavioural Sciences Research Center, Yazd University of Medical Sciences, – رضا بیدکی Yazd, Iran

طاهره شهرياري سرحدي - General Practitioner, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

Associate Professor, Department of Neurology, Geriatric Care Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran - عليرضا وكيليان

آتنا شريفی رضوی - Assistant Professor, Department of Neurology, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: علایم سندرم تونل کارپ شامل درد و پارستزی شبانه است. همراهی افسردگی با درد نوروپاتیک و بی خوابی (به علت رخ دادن درد در شب) بر کیفیت زندگی و پاسخ به درمان بیماران اثر دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی هم زمانی این دو اختلال صورت پذیرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی_مقطعی، ۷۹ بیمار مبتلا به سندرم تونل کارپ مراجعه کننده به بخش الکترودیاگنوستیک بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) رفسنجان در سال ۱۳۹۳ وارد مطالعه شدند. یافته های دموگرافیک از طریق چک لیست و میزان افسردگی و اضطراب از طریق پرسش نامه های افسردگی و اضطراب بک جمع آوری شدند. جهت آنالیز داده ها از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۲۱ استفاده شد. سطح معنی داری در آزمون ها ۵۰/۰ در نظر گرفته شد. یافته ها: در افراد مورد بررسی ۱۱ نفر (۱/۹ درصد) مبتلا به افسردگی متوسط و ۱۷ نفر (۱۲/۵ درصد) مبتلا به افسردگی شدید بودند. ۲۶ نفر (۹/۳۲ درصد) از بیماران دارای اضطراب متوسط و ۱۷ نفر (۱/۵۰ درصد) دارای اضطراب شدید بودند. بین میزان افسردگی و اضطراب با شدت بیماری از ماری در ۲۵ میند بودند. ۲۶ نفر (۹/۳۲ درصد) از بیماران دارای اضطراب متوسط و ۱۷ نفر (۱/۵۰ درصد) دارای اضطراب شدید بودند. بین میزان افسردگی و اضطراب با شدت بیماری ارتباط معنی داری یافت نشد، در حالی که میزان افسردگی و اضطراب در بیماران کارمند نسبت به سایر مشاط مورد بررسی و هم چنین فراد دارای تحصیلات دانشگاهی به صورت معنی داری کم تر بود. استناج: طبق نتایج حاصل از مطالعه اخیر، میزان افسردگی و اضطراب در بیماران میتلا به سندرم تونل کارپ بیش تر از میزان های گزارش شده در جمعیت عمومی است.

> کلمات کلیدی: carpal tunnel syndrome, depression, anxiety, سندرم تونل کارپ, افسردگی, اضطراب

> > لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

https://civilica.com/doc/1786832

