

عنوان مقاله:

بررسی شیوع انواع مختلف عوارض جانبی پس از عمل سزارین

محل انتشار:

دومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

فاطمه بهزادی - دانشجوی کارشناسی، گروه میکروبیولوژی، موسسه آموزش عالی خرد، بوشهر، ایران.

فاطمه جباری - دانشجوی کارشناسی، گروه میکروبیولوژی، موسسه آموزش عالی خرد، بوشهر، ایران.

مهناز عبیدی پور خضیری - دانشجوی کارشناسی، گروه میکروبیولوژی، موسسه آموزش عالی خرد، بوشهر، ایران.

بهذخت جمالی - استادیار، گروه میکروبیولوژی، موسسه آموزش عالی خرد، بوشهر، ایران.

خلاصه مقاله:

امروزه، ترجیح مادران برای حمل وضع حمل سزارین است که متأسفانه با عوارض جانبی فراوان کوتاه مدت و بلند همراه است. با این حال، مطالعه شیوع فراوانی این اختلالات پس از عمل سزارین کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. از این رو، در پژوهش حاضر شیوع انواع مختلف عوارض جانبی پس از عمل سزارین مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، پرسشنامه ای طراحی و در سایت دیجیفورم آپلود گردید و پس از تکمیل پرسشنامه توسط ۶۱ مادر سزارین کرده، داده ها در نرم افزار SPSS تجزیه تحلیل و نمودارها در نرم افزار اکسل ترسیم شدند. نتایج حاکی از شیوع بالایی دردهای لگن، قفسه سینه، کمر و کتف، اضافه وزن، بی اختیاری ادرار، افسردگی، سردرد شدید، ریزش مو و عفونت واژن پس از عمل سزارین بود. بنابراین، نتیجه گیری شد که با توجه با عوارض جانبی پس از عمل، توصیه میشود به غیر از مواردی که زایمان طبیعی خطری را متوجه مادر یا نوزاد کند، از عمل سزارین برای وضع حمل اجتناب گردد.

کلمات کلیدی:

سزارین، عفونت، درد، فراوانی.

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1903276>

