

عنوان مقاله:

بررسی فراوانی علائم روان پزشکی بیماران سندرم روده تحریک پذیر یک سال پس از تشخیص در مقایسه با گروه کنترل به شیوه خود ارزیابی

محل انتشار:

فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، دوره 9، شماره 3 (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 0

نویسندگان:

معصومه ابراهیمی - Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

ذلیخا کرم الهی - Clinical Research Development Unit 5azar Hospital, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran; Department of Midwifery, Ilam - University of Medical Sciences, Ilam, Iran

محمد زمان کامکار - Department of Psychiatry, Golestan Research Center of Psychiatry, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: سندرم روده تحریک پذیر (IBS)، یک اختلال عملکردی دستگاه گوارش است که ۳۰-۵ درصد از مردم جهان را تحت تاثیر قرار می دهد و با درد شکمی و تغییر در عادات روده مشخص می شود. نشان داده شده است که اختلالات خلقی، اضطرابی و جسمانی با درجات مختلف ناراحتی روانی در بیماران مبتلا به IBS همراه است. هدف مطالعه حاضر مقایسه فراوانی علائم روان پزشکی بیماران سندرم روده تحریک پذیر یک سال پس از تشخیص با گروه کنترل به شیوه خود ارزیابی می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-مقطعی، تعداد ۴۸ بیمار مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر (براساس معیار Rome IV) و ۴۸ فرد غیرمبتلا از بین مراجعه کنندگان به کلینیک گوارش بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و مطالعه وارد شدند. از شرکت کنندگان رضایت آگاهانه اخذ گردید. داده ها با استفاده از چک لیست و پرسشنامه SCL-۹۰-R جمع آوری شدند. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ و آزمون های کای دو و من وینتی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. یافته ها: دو گروه مورد و کنترل از لحاظ متغیرهای دموگرافیک شامل سن، جنسیت، تحصیلات، وضعیت تاهل و محل سکونت همسان بودند (۰/۰۵).

کلمات کلیدی:

irritable bowel syndrome, digestion, psychiatry, سندرم روده تحریک پذیر, گوارش, روان پزشکی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1931338>

